

Öllein

**OCTAL**  
Öllein

- **Hochertragreicher, mittelspäter Öllein**
- **Ausgesprochen gute Anpassungsfähigkeit an alle Leinstandorte**
- **Gute Gesundheit, sehr gute Standfestigkeit**

### **SORTENCHARAKTERISTIK**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| - Typ              | <b>Braunschaliger Lein</b>                         |
| - Nutzungsrichtung | <b>Menschliche und tierische Ernährung, Farben</b> |
| - Zulassung        | <b>2014 UK</b>                                     |

### **AGRONOMISCHE EIGENSCHAFTEN**

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| - Blühbeginn       | <b>Mittelspät</b> |
| - Reife            | <b>Mittelspät</b> |
| - Standfestigkeit  | <b>Sehr gut</b>   |
| - Fusarientoleranz | <b>Gut</b>        |
| - TKM              | <b>Mittel</b>     |
| - Pflanzenhöhe     | <b>Kurz</b>       |
| - Vitalität        | <b>Sehr gut</b>   |
| - Gesundheit       | <b>Sehr gut</b>   |

### **TECHNOLOGISCHE QUALITÄTEN**

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| - Ölgehalt                  | <b>Sehr hoch</b> |
| - Gehalt an C18-3 (Oméga 3) | -                |
| - Extrahierbarkeit          | -                |

### **BESTANDESFÜHRUNG**

**Aussaatstärke zwischen 600 und 750 Körnern /qm (50 – 65 kg / ha)**

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| - Abpackungen      | <b>Säcke à 25 kg</b>               |
| - Verfügbare Beize | <b>Ungebeizt, Standard-gebeizt</b> |

Stand 10 / 22 : Alle Sortenbeschreibungen nach bestem Wissen unter Berücksichtigung von Versuchsergebnissen und Beobachtungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, da die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.